

◆근관치료 수술 후 주의사항

1. 마취가 깨어난 후 동통이 있을 수 있으며 처방된 약을 복용 하십시오.
 2. 봉합사를 제거할 때까지 수술부의 찢을질을 삼가야 하며, 수술부에 구강 소독액을 사용하십시오.
 3. 흡연, 빨대 사용시 지속적인 출혈과 치유 지연의 원인이 되므로 1주일 동안 삼가 하시기 바랍니다.
 4. 수술 후 24시간 동안은 차가운 얼음찜질을 해 주시고, 반고형의 차가운 음식을 섭취 하십시오.
 5. 과도한 운동을 삼가고 수술당일 충분한 휴식을 취하시기 바랍니다.
 6. 수술 다음날 까지는 약간의 출혈이 있을 수 있습니다.
 7. 특별한 이상이 발생한 경우 진료과로 연락주십시오.
- (전북대학교병원 보존과 전화번호:
250-2119, 250-2219)

◆근관치료 수술 후 주의사항

1. 마취가 깨어난 후 동통이 있을 수 있으며 처방된 약을 복용 하십시오.
 2. 봉합사를 제거할 때까지 수술부의 찢을질을 삼가야 하며, 수술부에 구강 소독액을 사용하십시오.
 3. 흡연, 빨대 사용시 지속적인 출혈과 치유 지연의 원인이 되므로 1주일 동안 삼가 하시기 바랍니다.
 4. 수술 후 24시간 동안은 차가운 얼음찜질을 해 주시고, 반고형의 차가운 음식을 섭취 하십시오.
 5. 과도한 운동을 삼가고 수술당일 충분한 휴식을 취하시기 바랍니다.
 6. 수술 다음날 까지는 약간의 출혈이 있을 수 있습니다.
 7. 특별한 이상이 발생한 경우 진료과로 연락주십시오.
- (전북대학교병원 보존과 전화번호:
250-2119, 250-2219)